

Medicamento	Presentación	Dosis e indicaciones de ingesta	Posibles efectos adversos	Principales Interacciones	Medicamento inhibidor de la PMS	Presentación	Dosis e indicaciones de ingesta	Posibles efectos adversos	Principales Interacciones
	Comprimidos de 300 mg zidovudina / 150 mg lamivudina	1 comprimido cada 12 hrs vía oral. Tomar sólo o con alimentos	Anemia, neutropenia, Alergia en la piel, Dolores musculares, Lipotrofia, Molestias gastrointestinales	Interferón, Ribavirina, Doxiclorina, Ganciclovir		Cápsulas de 200 mg Cápsulas de 300 mg	300 o 400 mg/día. Siempre con comidas. No abrir cápsula.	Colitis ampollofílica, Piel y mucosas, Cálculos renales, Artritis, Náuseas, Vómitos, Diarrea, Dolor abdominal	Brotulaminicos, Benzodiazepinas, Inhibidor de bomba de protones (E: Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol), Hierba de San Juan, Sildenafil, Warfarina, Carbamazepina, Fenobarbital, Fentanilo, Tricíclicos, Itraconazol, Posaconazol, Voriconazol, Claratetamina, Rifaxamina, Rifaxipina, Bloqueadores de canales de calcio, Anticoagulantes orales, Lovastatina, Simvastatina
	Comprimidos de 600 mg abacavir / 300 mg lamvudina (Kivexa®)	1 comprimido al día vía oral. Tomar sólo o con alimentos	Reacción alérgica en la piel (se descartará previamente con un examen de sangre que predice si usted probablemente es alérgico) Molestias gastrointestinales	Metadona		Cápsulas de 100 mg	1 cápsula al día. Tomar con comidas	Náuseas, Vómitos, Diarrea, Paroxismos (homogéneo) de extremidades o perineales, Femicarditis	Ritavir (Norvir®)
	Comprimidos de 300 mg tenofovir / 200 mg emtricitabina (Truvada®)	1 comprimido al día vía oral. Tomar con alimentos	Diminución de la función renal, Diminución de la densidad mineral ósea, Molestias gastrointestinales	Abacavir sin Ritonavir, Didanosina, Darunavir sin Ritonavir, Lopinavir sin Ritonavir		Comprimidos 200 mg lopinavir 50 mg ritonavir	3 comprimidos cada 12 hrs vía oral. Pueden ser ingeridos con o sin comidas.	Diarrea, vómitos, dolor abdominal, Hiperglicemia, Hipertrigliceridemia, Liposarcumulación	Lopinavir/Ritonavir (Kaletra®)
	Comprimidos de 600 mg	1 Comprimido al día vía oral. Tomar con estómago vacío (2 horas después de la cena), antes de acostarse.	Alergia en la piel, Cefalías, Mareos, Pérdida de memoria, Suenos vividos, Pesadillas, Exacerbación de una depresión, Hipertrigliceridemia, Elevación de enzimas hepáticas, Tensión arterial, Náuseas, Vómitos, Diarrea.	Herba de San Juan, Metadona, Fentanil, Sildenafil, Sibutramina, capinas, Ergotamina, Anticonceptivos, Estatinas, Azoles, Rifabutina, Rifaxipina, Warfarina, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Bupropropion, Sertralina, Clorotromicina, Amodiaquina, Desmetomidina, Clodronato, Clopidogrel, Ranitidina, Famotidina		Comprimidos de 150, 400 y 600 mg	Dosis variable según indicación médica 600 mg darunavir/100 mg ritonavir 800 mg darunavir/100 mg ritonavir 1200 mg darunavir/100 mg ritonavir. Ingerir con alimentos.	Diarrea, Náuseas, Cefaleas, Congestión nasal	Darunavir (Prezista®)
	Comprimidos de 300 mg tenofovir / 200 mg emtricitabina / 600 mg efavirenz	1 comprimido al día vía oral. Tomar con estómago vacío (2 horas después de la cena), antes de acostarse	Sumatoria de terapias individuales	Sumatoria de tempos individuais		Comprimidos de 400 mg	1 comprimido (400 mg) cada 12 hrs vía oral. Puede tomarse con o sin alimentos	Diarrea, Cefaleas, Fiebre, Rash (en asociación con darunavir), Mitopatía, Hiperlipidolemia	Raltegravir (Isentress®)
						Comprimidos de 50 mg	Dosis variable según indicación médica	Aumento de la creatinina	Dolutegravir (Tivicay®)

En caso de presentar dudas o efectos adversos respecto a su terapia, contacte a su médico infectólogo tratante. Para atenciones en el Centro Médico San Joaquín, llamar al 223548490 o al mail infectcmjs@med.puc.cl, para atenciones en centro médico Ura, llamar al teléfono 223846000.

Todos se deben guardar a temperatura ambiente.